FERTEQ
GUARDTEQ
ADTEQ
SOILTEQ

НікодіГАРД (Кінкель)

ЕФЕКТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА РАХУНОК ПОЄДНАННЯ ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН

Післясходове рішення для контролю за більшістю широколистих та злакових бур'янів в кукурудзі. Нікосульфурон спеціалізується на боротьбі з основними видами злакових та ефективним знищенням деяких широколистих бур'янів, а дікамба гарантує ефекивність в боротьбі з широколистими бур'янами. Поєднання нікосульфурону та дікамби в **НікодіГАРД** забезпечує півдищений рівень ефективності в порівнянні з використанням двох діючих речовин поодинці.

ПЕРЕВАГИ

- оптимальне післясходове рішення для боротьби зі злаковими та широколистими бур'янами
- швидко абсорбується, синергетичний ефект двох різних діючих речовин, які суттєво збільшують спектр діяльності
- чудовий партнер для змішування (рекомендовано суміш з мезотріоном)

МЕХАНІЗМ ДІЇ

НікодіГард швидко поглинається рослинами. Два інгредієнти проникають через кутикулу в листок, а потім переносяться в меристеми та області високої метаболічної активності.

- **Дікамба** - проникає у бур'ян як через листок так і через корень, активно гальмує ріст і поділ клітин у бур'янів, порушують в них білковий та ліпідний обмін, що призводить до загибелі бур'янів. Саме загибель кореневої системи є головним важелем у боротьбі порти багаторічних бур'янів.
- **Нікосульфурон** - блокує фермент ацетолактатсинтазу (АЛС), який відіграє важливу роль у синтезі амінокислот в рослині. В результаті уповільнюється поділ клітин і гальмується подальший ріст бур'янів.

Діюча речовина: нікосульфурон 150 г/кг + дікамба 600 г/кг
Препаративна форма: водорозчинні гранули
Упаковка: 1 кг

1 + 1 = 3 сумісно с **НікодіГАРД**



- **НікодіГАРД** 250 г/га + ад'ювант
- дікамба 150 г/га
- Нікосульфурон - 40 г/га

soufflet agro ukraine

www.soufflet-agro.com.ua

РЕКОМЕДАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

З метою забезпечення найкращого результату, застосовувати під час активного росту бур‘янів та відповідних умов гідрометрії вітру та температури. Теплі та вологі умови після застосування збільшують загибель бур‘янів. Сухі умови можуть знизити ефективність з бур‘янами.

Для найсильнішого ефекту **Нікоді**ГАРД повинен завжди змішувти в баку відповідним ад‘ювантом, який покращує проникнення діючій речовини в тканини рослин. Найкращі результати забезпечує ад‘ювант **Оіл**АД^{плюс} в дозуванні 0,5 л/га (для об‘єму води в проміжку між 100-200 л/га).

СПЕКТР БУР‘ЯНІВ

злакові бур‘яни	**Нікоді**ГАРД + **Оіл**АД^{плюс}
Куряче просо	ВЧ
Росичка	ВЧ
Вівсюг	ВЧ
Зернова падалиця	ВЧ
Мишій сизий	ВЧ

ВЧ	високочутливий (конт. 95 - 100%)
Ч	чутливий (конт. 85 - 94%)
ПЧ	помірно-чутливий (конт. 70 - 84%)
ПТ	помірно толеранний (конт. 50 - 69%)
Т	толерантний

Двудольні бур‘яни	**Нікоді**ГАРД + **Оіл**АД^{плюс}
Підмаренник чіпкий	ПЧ
Гірчак березковидний	Ч
Гірчак звичайний (спориш)	ВЧ
Щириця звичайна	ВЧ
Лобода	ВЧ
Паслін чорний	ПТ
Ріпакова падалиця	ПЧ
Соняшникова падалиця	ПЧ

КУКУРУДЗА



ВИКОРИСТАННЯ

Культура	Доза кг/га	Доза води л/га	Період застосування
кукурудза	0,25–0,4	100–400	BBCH 12–15

Дотримуватися заходів з безпеки. Завжди читати етикетку та інформацію про виріб перед використанням.

soufflet agro ukraine

компанія Групи Суффле
ТОВ Суффле Агро Україна - вул. Б.Хмельницького, 43 с.Крупець,
Славутський р-н – Хмельницька обл. – 30 000
Тел.: +38 050 436 7011, +38 050 436 7562
Свідоцтво: 690246 - Код за ЄДРПОУ: 34863309
р/р 26009007739000 у Філія КІБ «ПАТ «Креді Агріколь Банк», м. Київ; МФО 300379
www.soufflet-agro.com.ua

groupe soufflet