



Факсиміл

СИСТЕМНИЙ ПІСЛЯСХОДОВИЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ОДНОРІЧНИХ ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- ▶ Забезпечує контроль підмаренника чіпкого
- ▶ Знищує усі види падалиці соняшника, у т.ч. стійкого до трибенурон-метилу та імідазолінонів
- ▶ Придатний для внесення восени
- ▶ Не проявляє фіто-токсичності
- ▶ Не має обмежень у сівозміні

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 50 г/л - флорасулам
ФОРМУЛЯЦІЯ: Концентрат суспензії (КС)
УПАКОВКА: 1 л

Культура	Фаза внесення	Доза	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Від фази 3х листків до появи прапорцевого листка культури і на ранніх стадіях розвитку бур'янів (2-4 листки)	0,075 – 0,125 л/га	1
Ячмінь			
Кукурудза	Від фази 3-6 листків культури і на ранніх стадіях розвитку бур'янів (2-4 листки)	0,075 – 0,125 л/га	1

ФЛОРАСУЛАМ:

- ▶ Пригнічує фермент ацетолаттасинтази, чим блокує утворення амінокислот – валіну, ізолейцину і лейцину. У результаті цього через кілька годин припиняється поділ клітин, ріст пагонів і кореневої системи бур'янів.

Зв'яжіться з представником
Суффле Агро у своєму регіоні:



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- ▶ Оптимальна температура повітря при внесенні - від +12 до +25°C.
- ▶ Найкращий час для проведення обробки – вранці (до 10 год.), або у вечірній час (18-22 год.).
- ▶ Перед використанням з іншими засобами захисту рослин обов'язково перевірити компоненти бакової суміші на фізико-хімічну сумісність.

Бур'ян	Ефективність
Амброзія полинолиста	●●●
Волошка синя	●●●
Галінсога дрібноквітова	●●●
Гірчак (види)	●●●
Гірчиця польова	●●●
Грицики звичайні	●●●
Кульбаба лікарська	●●●
Кучерявець Софії	●●●
Мак дикий	●●●
Осот городній	●●●
Осот жовтий	●●●
Соняшникова ПАДАЛИЦЯ	●●●
Підмаренник чіпкий	●●●
Редька дика	●●●
Ромашка (види)	●●●
Сокирки польові	●●●
Талабан польовий	●●●
Щириця (види)	●●●
Гібіскус трійчастий	●●
Жабрій звичайний	●●
Зірочник середній	●●
Кропива глуха	●●
Ріпакова ПАДАЛИЦЯ (стійка до імідазолінонів)	●●
Рутка лікарська	●●