



Мезоген

СЕЛЕКТИВНИЙ СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- ▶ Контролює широкий спектр дводольних та деяких однорічних злакових бур'янів
- ▶ Попереджує появу наступної хвилі бур'янів завдяки ґрунтовій дії
- ▶ Перешкоджає виникненню резистентності до препаратів із групи сульфоніл сечовин
- ▶ Ефективно контролює перерослі бур'яни
- ▶ Забезпечує період захисної дії – від 40 до 60 днів

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 480 г/л - мезотріону
ФОРМУЛЯЦІЯ: Концентрат суспензії (КС)
УПАКОВКА: 5 л

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- ▶ Оптимальна температура повітря при внесенні - від +12 до +25°С.
- ▶ Найкращий час для проведення обробки – вранці (до 10 год.), або у вечірній час (18-22 год.).
- ▶ Не застосовувати на посівах кукурудзи, насіння якої оброблено інсектицидами на основі фосфорорганічних сполук.
- ▶ Не рекомендовано використовувати інсектициди на основі фосфорорганічних сполук і тіокарбонатів за 7 днів ДО або ПІСЛЯ застосування препарату.
- ▶ Не рекомендовано змішувати з мікроелементами, зокрема з цинком, у будь-якій формі.
- ▶ Для досягнення рівномірного і достатнього обприскування рекомендуємо додавати прилипач ОілаД Плюс у нормі 0,3-0,5 л/га.

Культура	Фаза внесення	Доза	Максимальна кратність обробок
Кукурудза	У фазі від 3 до 8 листків кукурудзи включно	0,2 л/га + ПАР	1

Бур'ян	Ефективність
Амброзія полинолиста	●●●
Галінсога дрібноквіткова	●●●
Гірчиця польова	●●●
Горець почечуйний	●●●
Дурман	●●●
Зірочник середній	●●●
Жовтець польовий	●●●
Канатник Теофраста	●●●
Лобода (види)	●●●
Лопух звичайний	●●●
Паслін чорний	●●●
Пікульник звичайний	●●●
Портулак городній	●●●
Редька біла	●●●
Редька польова	●●●

Бур'ян	Ефективність
Ріпакова ПАДАЛИЦЯ	●●●
Суріпиця звичайна	●●●
Щириця (види)	●●●
Соняшникова ПАДАЛИЦЯ	●● (●)
Щавель	●● (●)
Берізка польова	●●
Гірчак звичайний (спориш)	●●
Куряче просо	●●
Росичка	●●
Хвощ польовий	●●
Гірчак березковидний	● (●)
Переліска однорічна	● (●)
Підмаренник чіпкий	● (●)
Мишій сизий	●
Осот	●