AGROFLASH

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ 2-2021

Гербіцидний захист озимих культур

Цього року склалася затяжна весна без високих температур. Зараз озимі зернові здебільшого знаходяться у фазі кущення ВВСН 21-25 і на більшості посівів є **проблема з бур'янами**, особливо зимуючими.

СОКИРКИ ПОЛЬОВІ

ТАЛАБАН І ГРИЦИКИ

ВЕРОНІКА

КУЧЕРЯВЕЦЬ СОФІЇ

ПІДМАРЕННИК ЧІПКИЙ

ПАДАЛИЦЯ РІПАКУ

Варіантів гербіцидів для зернових культур є багато, тому звертаємо увагу на основні **етапи вибору**:

- оглянути посіви і визначити видовий склад бур'янів,
- виділити переважаючі
- ОБОВ'ЯЗКОВО! якщо є падалиця соняшника або ріпаку – знати, чи був це традиційний гібрид, чи стійкий до імазамоксу чи трибенурон-метилу
- підібрати гербіцид або комбінацію діючих речовин для ефективного контролю забур'яненості, враховуючи СІВОЗМІНУ – яка культура планується наступною (щоб уникнути післядії).

soufflet AGRO UKRAINE

СУЛЬФОНІЛ-СЕЧОВИНИ

Найпоширеніша суміш цієї групи – **тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил**.

Вона має свої переваги, але і недоліки також:

- працює при температурі від 5-7°С
- має широке вікно застосування до фази прапорцевого листка (ВВСН 13-39)
- добре контролює такі бур'яни як – гірчиця польова, редька дика, мак-самосійка, талабан польовий, грицики звичайні, гірчаки та види осотів
- не контролює падалицю соняшника і ріпаку, стійких до трибенурон-метилу, імазамоксу та імазапіру
- потребує партнера для контролю перерослих бур'янів, таких як – вероніка, підмаренник чіпкий, рутка лікарська та ін.

ГОРМОНАЛЬНІ ГЕРБІЦИДИ

2,4 Д, Дикамба

- мають розширений спектр контрольованих бур'янів, особливо таких, як - лобода біла, паслін чорний, підмаренник чіпкий, падалиця всіх видів соняшника, ріпаку та ін.
- мають коротке вікно застосування - до ВВСН 32
- **важливою є температура внесення: +8!** Слід уникати внесення у випадках, коли рослини перебувають у стресі, або якщо прогнозується похолодання.

Фунгіцидний захист і регуляція росту озимих культур

Цими днями дуже актуальним є і **фунгіцидний захист**, тому що:

- **ОЗИМА ПШЕНИЦЯ** ранніх строків посіву є розкущеною і має велику вегетативну масу. На старих листках спостерігається ураження септоріозом, крім того, є поодинокі випадки снігової плісняви.
- **ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ** здебільшого уражений гельмінтоспоріозними плямистостями – темно-бура та сітчаста.

Ефективним рішення для боротьби з хворобами на ранніх етапах є внесення **фунгіцидів на основі триазолів**, а саме:

Ротразон ® – 1-1,5 л/га,
Фалькон ® – 0,4-0,6 л/га,
Капало ® – 1-1,5 л/га,
ТілтТурбо ® – 0,8-1 л/га,
РексПлюс ® – 0,8-1,2 л/га

Більше інформації у додатку FARMI

App Store Google Play

soufflet AGRO UKRAINE

AGROFLASH

З настанням високих температур багато виробників старатимуться внести усі продукти разом, у тому числі **регулятори росту для зернових**.

Але перш за все потрібно визначитися з метою проведення цієї операції:

Регуляція росту і **СТИМУЛЯЦІЯ КУЩЕННЯ** на нерозкущених посівах

- **Хлормекватхлорид** ® – 0,3-0,4 л/га + **СерiaСТАРТ** ® - 2 л/га
- **Хлормекватхлорид** ® – 0,8-1,5 л/га

Регуляція росту і **СКОРОЧЕННЯ ВІДСТАНІ МІЖ МІЖВУЗЛЯМИ**
Фаза розвитку - ВВСН 30-32

- **Медакс Топ** ® – 0,5-1 л/га
- **Модус** ® – 0,4-0,6 л/га
- **Терпал** ® – 1-1,5 л/га
- **Церон** ® – 0,5-0,75 л/га

УВАГА! При використанні регуляторів росту радимо обов'язково звертати увагу на температурний режим, необхідний для кожного продукта, а також консультуватися з агрономом!

Детальну інформацію щодо використання регуляторів на зернових ви можете знайти на **ст. 48-53 Довідника Суффле'ІНФО 2021**

soufflet
AGRO UKRAINE