



Флурокс

СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ЗЕРНОВИХ ТА КУКУРУДЗИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- ▶ Високоєфективний на усіх фазах розвитку однорічних і деяких багаторічних дводольних бур'янів, у т.ч. у фазі їх дозрівання
- ▶ Має дуже широке вікно застосування
- ▶ Швидко проникає у рослини бур'янів і зупиняє їх розвиток
- ▶ Забезпечує захисну дію до кінця вегетаційного періоду культури

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 333 г/л - флуроксіпіру
ФОРМУЛЯЦІЯ: Концентрат емульсії (КЕ)
УПАКОВКА: 5 л



Мак польовий

Підмаренник чіпкий

Зірочник

Ромашка

Берізка польова

Лобода

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- ▶ Оптимальна температура повітря при внесенні - від +8 до +25°С.
- ▶ Найкращий час для проведення обробки – вранці (до 10 год.), або у вечірній час (18-22 год.).
- ▶ Для контролю зілних бур'янів (берізка, гірчак, осот) рекомендовано використовувати у суміші з гербіцидом **Карма Екстра** (у нормі 2-3 л/га), залежно від фіто-санітарного стану поля перед посівом культури, або після збору врожаю і відростання бур'янів.
- ▶ Не рекомендований для обробки перед заморозками.
- ▶ Не рекомендований для посівів зернових із підсівом конюшини, люцерни, або інших бобових.

Культура	Фаза внесення	Доза	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Від фази кущення до фази прапорцевого листка включно після цвітіння пшениці і під час цвітіння берізки	0,3 – 0,5 л/га	1
Ячмінь	Від фази кущення до фази прапорцевого листка включно		
Кукурудза	Від фази 3 до 7 листків культури включно	0,5 – 0,6 л/га	1

Бур'ян	Ефективність
Підмаренник чіпкий	●●●
Соняшникова ПАДАЛИЦЯ	●●●
Гірчак березковидний	●● (●)
Берізка польова	●●
Гірчак звичайний	●●
Лобода	●●
Ромашка	●●●
Щавель	●●
Зірочник	●●
Мак польовий	●●
Щириця	●● (●)
Паслін чорний	●
Ріпакова ПАДАЛИЦЯ	●

Зв'яжіться з представником Суффле Агро у своєму регіоні:



Отримайте консультацію агрономічної служби:

